

บัวงก: สมนไพรมากคุณประโยชน์

Centella asiatica (Linn.) Urban: A Very Useful Herb

จันทรพร ทองเอกแก้ว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34190

E-mail: jantaporn_25@yahoo.com

ນທຄ້ອຍ່ອ

บัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urba เป็นพืชสมุนไพรที่ให้สารในกลุ่มตriterpenoid glycoside) หล่ายชนิด เช่น กรดอะเซียติก (Asiatic acid) สารอะเซียติโคไซด์ (Asiaticoside) และกรดแมเดคัซีด (Madecassic acid) หรือ สารแมเดคัสโซล (Madecassol) ที่ให้ผลต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidation) ซึ่งส่งผลในการลดความเสื่อมของเซลล์ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ และยังพบว่าสารไกลโคไซด์เหล่านี้ยังช่วยเร่งการสร้างสารคอลลาเจน (Collagen) ที่เป็นโครงสร้างของผิวหนัง จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้แผล瘻มานดูดีเร็ว อีกทั้งมีรายงานว่าใบบัวบกมีประโยชน์ในการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ช่วยบำรุงประสาทและความจำ บำรุงหัวใจ บำรุงตับ ไต และสมอง ช่วยขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล แพลงเบิร์อย แก้โรคเรื้อรัง แก้บิด แก้อาการปวดศีรษะและเป็นไข้ นอกจากนี้บัวบกยังมีคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวิตามินหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอ โภคภัณฑ์ วิตามินบี 1 โภคภัณฑ์ วิตามินบี 2 โภคภัณฑ์ วิตามินบี 3 วิตามินซี การดูแลผิวนั้นๆ ได้แก่ แสงอาทิตย์ กลูต้าเมต เซอร์อีน ทรีโโนนีน อะลารีน ไลซีน อีสต์เกลิน และเมราตาแคลเซียม พอสฟอรัส เหล็กในปริมาณสูงเข่นกัน จึงนับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง

คำสำคัญ : บัวก สมนไพร ไตรเทอปินอยด์ ไอลโคไซด์ ต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความเสื่อมของเซลล์

Abstract

The herb *Centella asiatica* (Linn.) Urban contains the triterpenoid glycosides asiatic acid, asiaticoside, and medecassic acid or medecassol which displays antioxidant activity. As a potent antioxidant it is effective in the protection of cells and organs against oxidative damage. In addition, the total triterpenoid fraction extracted from *C. asiatica* increases the percentage of collagen in the fibronectin cell layer and thus may help in the healing of wounds. The leaves are said to be useful as a diuretic, a tonic for nerves, memory, and vital organs such as the heart, liver, kidneys, and brain, and in the treatment of ulcerations, leprosy, dysentery, headaches, and fever. Moreover, *C. asiatica* contains nutritional substances such as vitamins (vitamin A, B1, B2, B3, and C), amino acids (aspartate, glutamate, serine threonine, alanine, lysine, and histidine), and trace elements such as calcium, phosphorus, and iron. Thus, *C. asiatica* is a valuable herb.

Keywords: *Centella asiatica*; Herb; Triterpenoid glycosides; Antioxidant; Oxidative damage

ลักษณะทั่วไปของบัวบก

บัวบกเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Umbelliferae มีชื่อทางพุทธศาสตร์ว่า *Centella asiatica* (Linn.) Urban ชื่อสามัญ gotu kola ชื่อภาษาอังกฤษ Asiatic Pennywort และชื่อพื้นเมืองมีหลายชื่อ เช่น ผักว่าน (ได้) ผักหนอก (เหนือ) มะหนะเข้าเด้า (กะเรี้ยง-แมงอ่องสอน) เป็นผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีอายุหลายปี ปลูกง่ายเลี้ยงยากไปตามพื้นดิน แต่กรากตามข้อใบ ใบเป็นรูปไต ขอบใบหยัก กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร

ยาว 1-5 เซนติเมตร ก้านยาว 1-25 เซนติเมตร ลักษณะใบและก้านบัวบกแสดงดังรูปที่ 1 ดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ ขนาดเล็ก 2-3 ดอก กลีบดอกสีขาว ผลแบน [1]

บัวบกชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นแต่ไม่แห้งมากหรือแห้งท่วมขึ้น โดยมากจะขึ้นตามใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือห้องร่องในสวน และตามคันนา ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือตัดแยกใหม่ที่มีต้นอ่อนและราก นำไปปลูกในที่มีแสงแดดพอควร ก็จะเจริญเติบโตได้ดี พบรากในประเทศแคนาดาและอเมริกาใต้ จึงถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย [2]




รูปที่ 1 ลักษณะใบและก้านบัวบก

ที่มา: <http://xn--22c0dfcja2ccet9cbhx6d0g.blogspot.com> และ <http://xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com>


บัวบกมีประวัติการใช้ประโยชน์ในด้านยาธาร์โคมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี โดยส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่วนของใบและราก สามารถนำมาธารษาอาการช้ำใน บำรุงหัวใจ บำรุงตับ ไต และสมอง บำรุงประสาทและความจำ ช่วยขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล แผลเปื่อย แก้โรคเรื้อรัง โรคบิด ลดอาการปวดศีรษะและไข้ [3]

สารมีประโยชน์ที่สำคัญที่พบในบัวบก


สารที่พบในบัวบกจัดอยู่ในกลุ่มไตรเทอปิโนไซด์ (Triterpenoid glycoside) ประกอบด้วยกรดอาเซติก (Asiatic acid) สารอาเซติโคไซด์ (Asiaticoside) กรดแมเดคัซิก (Madecassic acid) หรือ สารแมเดคัล (Madecassol) [4], [5] โครงสร้างสารประกอบดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 2



Molecular Structure Asiatic acid C₃₉H₄₈O₅



Molecular Structure Asiaticoside C₄₈H₇₈O₁₉



Molecular Structure Madecassic acid $C_{30}H_{48}O_6$



รูปที่ 2 โครงสร้างของสารกลุ่มไตรเทอปิโนยด์ ไกลโคไซด์ที่พบในบัวบก
ที่มา: <http://www.chemblink.com/products.htm>

การใช้ประโยชน์จากบัวบกทางด้านเภสัชกรรม

1. ด้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Anti-oxidation) ของสารอนุมูลอิสระ ทำให้ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ เนื่องจากพิษของสารอนุมูลอิสระมีผลทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ส่งผลให้เกิดความผิดปกติบันสารชีวโมเลกุลต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ไขมัน โปรตีน และนิวคลีโอไทด์ [6] โดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid, PUFA) จะเกิดกระบวนการลิปิดเปอรอกซิเดชัน (lipid peroxidation) ของฟอสโฟลิปิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ ลิปิด เปอรอกซิเดชัน (lipid peroxide) ที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นสารที่ไม่คงตัวและสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นได้ เช่น สารมาลอนไดอัลดี-ไฮด์ (Malondialdehyde; MDA) ดังรูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาดังกล่าวจะส่งผลให้การทำงานของร่างกายผิดปกติ เกิดการตายของเซลล์หรือเนื้อเยื่ออวัยวะภายในร่างกาย ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไตawayเรื้อรัง โรคมะเร็ง เป็นต้น [7]


ชั้นระดับของ MDA สามารถนำมาใช้เพื่อถ่วงเวลา เครียดออกซิเดชันได้ กล่าวคือ ถ้าปริมาณของ MDA มีปริมาณมาก แสดงว่าผนังเซลล์มีการสลายเนื่องมาจากอนุมูลอิสระ โดยมีรายงานการศึกษาของนักวิจัยที่สนับสนุนการค้นพบสารที่เป็นตัวต่อด้านการกัดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidant defense) จากสารสกัดบัวบก ได้แก่ Hussin และคณะ [8] ที่ได้ทำการศึกษาการให้สารสกัดจากบัวบกร่วมกับวิตามินอี (α -tocopherol) ในน้ำอีมั่นแก่หนูทดลอง เป็นเวลา 25 วัน พนว่าระดับ MDA ในเลือดลดลง อันเกิดจากการลดลงของปฏิกิริยาลิปิดเปอรอกซิเดชันและเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่กำจัดสารอนุมูลอิสระ (free radical-scavenging) ได้แก่ superoxide dismutase (SOD)

และ catalase ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในหมูเพิ่มขึ้น สำหรับการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่กำจัดสารอนุมูลอิสระ แสดงดังรูปที่ 4



รูปที่ 3 การเกิดกระบวนการลิปิดเปอรอกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในฟอสโฟลิปิดที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์

ที่มา: http://www.scielo.br/scielo.php%3Fpid%3D..._art-text



รูปที่ 4 การทำงานของเอนไซม์ Superoxide dismutase (SOD), catalase และ Glutathione peroxidase (GPX) ในการทำลายสารอนุมูลอิสระ (ที่มา: http://www.rndsystems.com/DAM_public/5270.gif)

2. เร่งการสร้างสารคอลลาเจน (Collagen synthesis enhancer) โดยคอลลาเจนจัดเป็นโปรตีนสำคัญของผิวหนัง และอยู่คู่กับโปรตีนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ อิลัสติน (Elastin) คอลลาเจนมีหน้าที่เสริมอ่อนโครงสร้างของผิว และทำให้ผิวเต่งตึง อิลัสตินจะมีหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผิว และทำให้ผิวที่เป็นโครงสร้างของผิวหนังไม่มีวีรกรรม ช่วยรักษาแผล รอยเที่ยวบาน และลดการอักเสบ สารสกัดจากใบบัวบกจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น มีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาการนำสารสกัดจากใบบัวบกที่ซื้อ เอเชียติโคไซด์ มาทดสอบความสามารถในการรักษาแผลเมื่อเทียบกับยาต้านฟื้น ที่ความเข้มข้นเพียง 0.2% สามารถให้ผลในการเร่งการสมานแผลหรือช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น โดยผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเร่งให้เซลล์มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจน (Collagen synthesis) และเร่งการสร้างช่องแคมเส้นเลือดที่เสียหายไป (Angiogenesis) ให้กลับคืนมา [9], [10], [11], [12] ด้วยประโยชน์ดังกล่าว บัวบก จึงถูกนำมาใช้เพื่อรักษาแผลร้อนในในปากได้

3. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่อเนื่องเมื่อทำให้ลดความเสี่ยงของภาวะบวม อักเสบในผู้สูงอายุที่มีแรงดันในเส้นเลือดค่าสูง หรือลดอาการโรคเลือดคั่งที่ทำให้ข้ามไว้ในผู้ที่เดินทางนานๆ ในรถหรือเครื่องบิน โดยมีคณภาพพทญ และนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองใช้สารสกัดจากใบบัวบก (Titrated extract of Centella asiatica ; TECA) ให้กับคนไข้ที่มีปัญหารွ่องของระบบไหลเวียนเลือดที่มีต่อเท้าและขา (Lower Limb) จนเกิดภาวะเจ็บปวด

จำนวน 94 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ให้ TECA ในปริมาณวันละ 120 มิลลิกรัม และ 60 มิลลิกรัม และกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้สารสกัดดังกล่าว (Control double-blind) แต่ให้สารอื่นๆ ที่ไม่มีตัวยาแทน (Placebo) ผลการทดลองพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดจากใบบัวบก มีอาการเจ็บปวดเท้าและขาอย่าง และมีอาการบวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดดังกล่าว มีอาการของโรคครุณแรงขึ้น [13], [14], [15] ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมคนไทยจึงนิยมที่จะดื่มน้ำต้มจากใบบัวบก เพื่อแก้ปัญหาฟกช้ำด้วย เช่นเดียวกับชาจากบัวบกที่ช่วยน้ำกัดจากเส้นเลือดแดงขนาดเล็กถูกทำลายจากการกระแทกทำให้เกิดการถังของเลือด และหากระบบปี华丽เวียนของเลือดบริเวณดังกล่าว ถูกปรับปรุงก็จะทำให้ภาวะฟกช้ำดีขึ้นหรือเจ็บปวดหายไป

นอกจากสรรพคุณจากตัวอ่อนย่างผลการวิจัยดังกล่าว ข้างต้นแล้ว ยังพบว่าสารสกัดจากใบบัวบกสามารถให้สรรพคุณที่เกิดต่อเนื่องจากการปรับปรุงระบบปี华丽เวียน โลหิตและหลอดเลือดอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สามารถป้องกันภาวะความจำเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์) ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง บำรุงสมอง ทำให้มีความคิดอ่านดีขึ้นได้ แต่ยังเป็นการทดลองในระดับสัตว์ทดลอง เช่น งานวิจัยของ Veerendra and Gupta [16] ได้ทำการศึกษาผลของสารสกัดใบบัวบกที่ความเข้มข้น 100, 200 and 300 mg/kg ต่อการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในหมูทดลอง ที่ได้รับสาร Intracerebroventricular (i.c.v.) streptozotocin (STZ) ซึ่งเป็นสารที่เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงความชรา ปริมาณ 3 mg/kg, i.c.v. ในวันที่ 1 และ 3 ของการทดลอง

จากนั้นได้ให้สารสกัดใบบัวบกแก่หนูเป็นเวลา 21 วัน เมื่อครบถ้วนที่ 21 ของการทดลอง จึงนำสารสกัดจากสมองของหนูทดลองมาวิเคราะห์ปริมาณ MDA, glutathione, superoxide dismutase และ catalase ที่เป็นตัวแปรในการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันพบว่า สารสกัดใบบัวบกที่ความเข้มข้น 200 and 300 mg/kg สามารถลดระดับของการเกิด MDA และเพิ่มปริมาณของ glutathione และ catalase ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากบัวบกสามารถลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจาก i.c.v. STZ ได้

คุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ

ใบบัวบกถูกนำมาเป็นผักสดแก้กลิ้งอาหารหลายประเภท ได้แก่ หมึกอบ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย แกงผัด ลาบ ก้อย และน้ำพริกต่างๆ ในใบบัวบก 100 กรัม ให้พลังงาน 44 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย โปรตีน 1.8 กรัม ไขมัน 0.9 กรัม คาร์บไฮเดรต 7.1 กรัม เส้นใย 2.6 กรัม แคลเซียม 146 มิลลิกรัม พอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม เหล็ก 3.9 มิลลิกรัม วิตามินเอ 10,962 IU วิตามินบี 1 0.24 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.09 มิลลิกรัม ในขณะนี้ 0.8 มิลลิกรัม และวิตามินบี 4 มิลลิกรัม [17] จะเห็นว่าบัวบกเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจมาก นอกจากจะมีสารที่มีประโยชน์ทางด้านยาตักษ์โรคแล้ว ยังมีคุณค่าโภชนาการสูงอีกด้วย ดังนั้นการบริโภคใบบัวบก เป็นอาหารและเป็นเครื่องดื่มจะส่งผลดีต่อร่างกาย เป็นอย่างยิ่ง

เอกสารอ้างอิง

- [1] บัวบก-วิกิพีเดีย: <http://th.wikipedia.org/wiki/บัวบก>
- [2] Kirtikar, K.R. and Basu, B.D. 1987. **Indian Medicinal Plants**, M/S Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehra Dun and Periodical Experts Delhi, Reprint ed. pp. 1193-1195.
- [3] Kapoor, L.D. 2005. **CRC Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants**. CRC press LLC, Florida. pp. 208-209.
- [4] Rastogi, R.P., Sarkar, B. and Dhar, M.L. 1960. "Chemical examination of Centella asiatica Linn. I, Isolation and the chemical constituents". **J. Sci Ind Res sect B**: 19: 252.
- [5] Singh, B. and Rastogi, R.P. 1969. "A reinvestigation of the triterpenes of Centella asiatica". **Phytochem**: 8: 917.
- [6] รัตนนา บรรจิเดชพงศ์ชัย. 2544. ระดับกลูต้าโรโนน (glutathione) ในเลือดคนไทย กลุ่มผู้ใหญ่เที่ยง กับกลุ่มผู้สูงอายุ. ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ pp. 1-4.
- [7] Basu, T.K. 1999. "Potential role of antioxidant vitamins". In: Basu, T.K., Temple, N.J., Garg, M.L., editors. **Antioxidants in Human Health and Disease**. UK: CABI: 15-26.
- [8] Hussin, M., Abdul-Hamid, A., Mohamad, S., Saari, N., Ismail, M. and Hair Bejo, M. 2007. "Protective effect of Centella asiatica extract and powder on oxidative stress in rats". **Food Chemistry** 100: 535–541.
- [9] Maquart, F.X., Bellon, G., Gillery, P., Wegrowski, Y. and Borel, J.P. 1990. "Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by a triterpene extracted from Centella asiatica". **Connect Tissue Res.** 24: 107-120.
- [10] Bonte, F., Dumas, M., Chaudagne, C. and Meybeck, A. 1994. "Influence of asiatic acid, madecassic acid, and asiaticoside on human collagen I synthesis". **Planta Med.** 60: 133-135.
- [11] Shukla, A., Rasik, A.M. and Dhawan, B.N. 1999a "Asiaticoside-induced elevation of antioxidants levels in healing wounds". **Phytother Res** 13: 50-54.
- [12] Shukla, A., Rasik, A.M., Jain, G.K., Shankar, R., Kulshrestha, D.K. and Dhawan, B.N. 1999b. "In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica". **J Ethnopharmacology** 65: 1–11.
- [13] Pointel, J.P., Boccalo, H., Cloarec, M., Ledevenhat, C. and Joubert, M. 1987. "Titrated extracted of Centella asiatica (TECA) in the treatment of venous insufficiency of the lower limbs". **Angiology** 38: 46-50.

- [14] Cesarone, M.R., Belcaro, G., Rulo, A., Griffin, M., Ricci, A., Ippolito, E., De Sanctis, M.T., Incandela, L., Baver, P., Cacchio, M., Bucci, M. 2001a. "Microcirculatory effects of total triterpenic fraction of Centella asiatica in chronic venous hypertension: measurement by laser Doppler, TcPO₂-CO₂, and leg volumetry". **Angiology** 52: S45-48.
- [15] Cesarone, M.R., Incandela, L., De Sanctis, M.T., Belcaro, G., Geroulakos, G., Griffin, M., Lennox, A., Di Renzo, A.D., Cacchio, M., Bucci, M. 2001b. "Flight microangiopathy in medium- to long-distance flights: prevention of edema and microcirculation alterations with total triterpenic fraction of Centella asiatica". **Angiology** 52: S33-37.
- [16] Veerendra Kumar, M.H. and Gupta, Y.K. 2003. "Effect of Centella asiatica on cognition and oxidative stress in an intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer's disease in rats". **Clin Exp Pharmacol Physiol** 30: 336-342
- [17] บัวบก (**Asiatic Pennywort**). www.horapa.com/content.php?Category=Herb&No=675, 25/10/2006.